

## Esvaziamento Gástrico (Sólido)

Dia do exame	<u>:</u>	. /		/.	 	
Horário:	h		mir	1		

## Preparo para o exame:

- 1. Jejum de 6 horas.
- 2. Suspender por 24 horas antes do exame, medicações tais como: Metoclopramida (Plasil, Plamet), tegaserod, eritromicina, domperidona, meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, glicopirolato.
- **3.** Pacientes que usam medicações de rotina, com exceção das acimas citadas, deverão tomá-las pela manhã, ao levantar-se, com pequena quantidade de água.
- **4.** Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã durante todo o exame.
- 5. Pacientes do sexo feminino deverão realizar o exame nos 10 primeiros dias do ciclo menstrual.
- **6.** Diabéticos deverão coletar glicemia que deverá estar menor que 200mg/dL. No momento da ingestão da refeição, os diabéticos insulino-dependentes deverão utilizar insulina em dose habitual.
- **7.** Levar para o exame: 2 ovos, fatia de pão de forma branco, 2 sachês (potinhos) de geléia de morango. (Uma pequena quantidade de material radioativo será adicionada em uma omelete de claras preparada na clínica).
- **8.** Uma vez preparada a omelete, o paciente será encaminhado à sala de exames e será orientado a ingerir toda a refeição (omelete+pão+geléia).
- **9.** Após o término da refeição, o paciente será posicionado na maca do aparelho e imagens serão adquiridas imediatamente, 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas após a ingestão.
- **10.** O exame tem duração aproximada de 4 horas.