



Rua Maestro João Seppe s/n  
(atrás da Santa Casa)  
(16) 3371-4042 - 3364-2609  
São Carlos SP

## Pesquisa de Corpo Inteiro com 131 IODO

Dia do exame: ...../...../.....

Horário: ..... h ..... min

### Preparo para o exame:

1. É obrigatório um jejum de 6 horas para que o traçador seja bem-absorvido.
2. Medicamentos que devem ser suspensos por **30 dias**:  
Puran T4, Levoid, Synthroid e Euthyrox.
3. Medicamentos que contenham como princípio ativo a Amiodarona devem ser suspensos por no mínimo, **90 dias** ou a critério do médico. Nos casos de uso prolongado dessa medicação, o tempo de suspensão pode ser maior do que esse período.
4. Medicamento que deve ser suspenso por **15 dias**:  
Triiodotironina (T3).
5. Medicamento que de ser suspenso por **7 a 10 dias**:  
Corticoides (esse período pode ser menor, em algumas condições, sob orientação médica).  
*Os medicamentos só devem ser suspensos sob orientação médica.*
6. Não realizar radiografias com contrastes iodado e exame ginecológico (teste de Schiller) e nem utilizar medicamentos (xarope para tosse, vitaminas e complementos, soluções tópicas como Polvedine, álcool iodado) entre **60 e 90 dias** antes do exame.
7. Evitar passeios na praia e banho de mar, além de bronzeadores por **15 dias** antes do exame.
8. É necessário fazer uma dieta pobre em iodo por **2 semanas** antes da realização do exame (ver tabela).